

¿Que se debe hacer si ocurre algún daño?

Labio, cachete o lengua mordida o cortada

- Si hay sangrado, ponga presión directa al área con una gaza o un trapito limpio.
- Si hay inflamación, ponga compresas frías.
- Si el sangrado no se puede controlar, lleve al niño/a al dentista.

Diente roto

- Limpie el área dañada con agua tibia.
- Haga que el niño/a muerda en la gaza, encima del diente roto.
- Si hay inflamación, ponga compresas frías.
- Lleve al niño/a al dentista. No olvide traer los fragmentos del diente roto.

Dientes avulsionados (expulsados por accidente o golpe)

- Encuentre el diente, pero no toque la raíz.
- Si el diente está sucio, enjuaguelo cuidadosamente con agua. No lo talle ni quite ningún tejido adherido.
- Intente reinsertar el diente en el espacio adecuado y si no le es posible, ponga el diente en leche descremada fría o en agua.
- Lleve al niño/a al dentista immediamente. No olvide traer el diente. El tiempo es muy importante en tratar de salvar el diente.

Sangrado después de que el diente de leche se cae

- Haga que el niño/a meurda en una gaza doblada en el área de sangrado, de 10 a 15 minutos.
- Cambie la gaza y repita el procedimiento hasta 3 veces.
- Si el sangrado persiste, lleve el niño/a al dentista.



DHHS
Nebraska Department of Health and Human Services